

TEST DI PRESELEZIONE N. 2

- 1) Per valutare l'equilibrio e l'andatura nel cammino del residente si utilizza la scala:
  - a) Scala di valutazione Tinetti
  - b) Scala Norton
  - c) Barthel Stato Funzionale
  
- 2) Come deve essere posizionata la persona con disfagia durante l'assunzione degli alimenti?
  - a) Posizione seduta con tronco eretto e capo leggermente reclinato in avanti
  - b) A 45° sul piano del letto con il capo iperesteso all'indietro
  - c) Posizione seduta con tronco reclinato e capo iperesteso all'indietro
  
- 3) Nella relazione di aiuto, cosa significa ascolto attivo?
  - a) Orientare la persona su un contenuto comunicativo particolare
  - b) Prestare attenzione e interesse a ciò che la persona ci dice
  - c) Aiutare la persona e porle domande semplici
  
- 4) Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza?
  - a) Le mani dell'operatore sanitario
  - b) Tutti gli strumenti sanitari
  - c) La biancheria e gli effetti personali dell'assistito
  
- 5) Cosa significa aprassia?
  - a) difficoltà di articolare e comprendere le parole
  - b) perdita della capacità di compiere atti volontari e finalizzati
  - c) incapacità di riconoscere oggetti e persone

- 6) Secondo le raccomandazioni OMS (organizzazione mondiale della Sanità) quanto deve durare il lavaggio delle mani con soluzione alcolica?
- a) 60-90 secondi
  - b) 20-30 secondi
  - c) 30-40 secondi
- 7) Durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) quando va usato il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno)?
- a) Dopo 2 minuti di RCP per garantire una corretta ossigenazione del cervello e del cuore
  - b) Dopo aver praticato almeno 1 minuto di RCP per garantire una corretta ossigenazione del cervello e del cuore
  - c) immediatamente o appena disponibile
- 8) Durante il PAI l'equipe condivide con i familiari che in questi mesi la scala Barthel Mobilità è passata da un punteggio di 40/40 a 22/40. Questo significa che:
- a) La persona è migliorata nelle abilità delle ADL
  - b) La persona presenta lesioni da decubito
  - c) La persona è migliorata nella capacità di muoversi
- 9) Quali accorgimenti utilizza l'oss per comunicare con una persona con una demenza moderata?
- a) si mette di fianco e tocca il braccio per rassicurarlo, parlando a voce moderata
  - b) si pone davanti, cerca il contatto visivo e parla in tono pacato con frasi semplici
  - c) si pone dietro, tocca le spalle e parla a voce moderata
- 10) L'ulcera da pressione di 1° stadio è:
- a) una lesione superficiale che si presenta come un'abrasione o vescicola
  - b) è un eritema persistente su cute integra
  - c) è un arrossamento non persistente